01 V4

Visentina 1

Vass4R06s586-590

domindumindumindumind



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1202

M Jimentina N

Visentina I 4 R 6 1 586, 590

rendsar







Formulaire de description 2/8 (floraison)

Année :

Code cépage : ...

2000

Code clone

Nom cépage: Visentina 1

Observateur: TL

Emplacement: 4 R6 \$ 586-590

Semble HPD som Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1) en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 -

forte 7 - très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9) oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1) jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7) très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible (1) faible 3 movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 movenne 5 + forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne(5)- forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 203 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225) Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

très forte 219. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230)plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8 (floraison)

2000 Observateur: TL Année : Code clone Code cépage : Emplacement: 4 R6 A 586-590 Nom cépage : Visentina 1 Rameau herbacé oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7) retombant 9 oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges/2)- rouge 3. oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges > - rouge 3. oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1) présence 9 oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 - présence 9) oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5) forte 9. oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5) forte 9. oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1) moyenne 2 - forte ou très forte 3 oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) (1) subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 très longues (>30cm) 9 Inflorescence oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5. oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1) au-delà du 4° noeud 2. oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3) plus de trois 4. oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) / Très élevé (>80%) 9. Vassal: Surface du rameau herbacé : unie 1) côtelée 2.

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

Couleur des vrilles : verte 260 / jaune 261 - rouge 262 et 263

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Visentina 1 4 R6s-586.590s.2

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143/

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 149 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 1/65/ - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 ayou entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 1/6/- partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 96

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

2000 Année:

Code introduction:

Observateur: IT TD

Code cépage :

Nom introduction: Visentina 1

Emplacement: 4 RGASEG. 590

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5- grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme D- pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 6)- vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4- tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 1 - présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 1

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre):

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte D- très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente P- présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte D- très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accob-V / dent = oui-nop / dégarni un parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison): très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 10 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré D- coloré 1. N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Avec pepins - apyrène.

Visentina 1 4R6 s.586.590s.2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :16 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91 Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111/ A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129) A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34/ A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139/- molle 140 - peu juteuse.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année:

2000

Code introduction:

Observateur: JUTD

Code cépage :

Nom introduction: Visentina 1

Emplacement: 4 R6, 586-590

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5)

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence D- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence P- présence 9.

oiv 351 vigueur: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 32 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 9 -

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 9 grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue 10

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 🗗 – présente 3.

Désignation : Visentina 1 Emplacement : 4 8 6 1 586.590

```
: 1 -(2)- 3
Angle des nervures
                                     . 4 - 5 - 6
Sexe
                                     : (7)-(8)-9
                                     : 10 - (11) .
L1/L
L2/L
                                    : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                    : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : 25 - (26) -- 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
                                    : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                     : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire :
                                       30
                                     : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Forme sinus latéral Sup.
 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                     : (271)
 Sinus latéral Supérieur ouvert
                                     : (40) - (41)
 Dents : forme
                                     : 42 - (43) - 44
 Dents (angle)
                                     : (45) - (46) - (47)
 Angle du lobe terminal
 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                     : (60) - 61 - 62
: (63) - (64) - (65) - 66 - 67
 Angle des nervures L3 L'3
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües